



ที่ พช ๐๐๓๒.๒๐๕/๒๖๖

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๒๐๓ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๔

(Handwritten signature)

เรื่อง ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค
โดยแมลงที่๔.๓เพชรบูรณ์/โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง/โรงพยาบาลเพชรบูรณ์/
นายกเทศมนตรีเทศบาล /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)
(นางอภิสรา ปวงแก้ว)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

ด้วยงานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้จัดทำสรุปรายงานเฝ้าระวังโรค เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนแนวโน้มในการเกิดโรค พร้อมทั้งจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมป้องกันโรค

ในการนี้ จึงใคร่ส่งสรุปรายงานดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติ ทตานุรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

งานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โทร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๐ ต่อ ๒๐๐๘
โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๖๐๗

รายงานการเฝ้าระวังโรค

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้อมูลจากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506 และ รง.507) จำนวนบัตรรายงาน 506 มีจำนวนทั้งสิ้น 477 บัตร เป็นบัตรรายงานโรค ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 408 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 402 บัตร คิดเป็นร้อยละ 98.53 สถานีอนามัยเครือข่าย จำนวน 65 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 65 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และจากโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จำนวน 4 ฉบับ มีความทันเวลาการรายงาน จำนวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 1 จำนวนการส่งบัตรรายงาน 506 จำแนกรายสถานบริการ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ชื่อสถานพยาบาล	บัตรรายงาน506	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ส่งไม่ทันเวลา	ร้อยละ	หมายเหตุ
รพ.เพชรบูรณ์	408	402	98.53	6	1.47	
รพ.ค่ายพ่อขุนฯ	0	0	0	0	0	
รพ.เพชรรัตน์	4	4	100	0	0	
กกกะยาง	3	3	100	0	0	
ซอนไพร	1	1	100	0	0	
ดงมูลเหล็ก	0	0	0	0	0	
ตะเภา	2	2	100	0	0	
ถ้ำน้ำบึง	0	0	0	0	0	
ท่าพล	7	7	100	0	0	
นางิ้ว	0	0	0	0	0	
นาป่า	7	7	100	0	0	
น้ำร้อน	0	0	100	0	0	
บ้านโคก	7	7	100	0	0	
บ้านพล้า	1	1	100	0	0	
บ้านพี	15	15	100	0	0	
ป่าแดง	8	8	100	0	0	
โป่งหว้า	1	1	100	0	0	
พนานิคม	0	0	0	0	0	
ยางลาด	0	0	0	0	0	
ระวิง	1	1	100	0	0	
วังชมพู	7	7	100	0	0	
วังทอง	0	0	0	0	0	
สะเตียง	4	4	100	0	0	
หนองผักบุ้ง	1	1	100	0	0	
ห้วยสะแก	0	0	0	0	0	
ห้วยใหญ่	0	0	0	0	0	
รวมทั้งหมด	477	471	98.74	6	1.26	

ตารางที่ 4 จำนวนบัตร รง.506 และ ความทันเวลาการรายงานโรคทางระบาดวิทยา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน	โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา			โรคติดต่อสำคัญ			หมายเหตุ
	โรคที่ต้อง รายงานด้วย บัตร 506/507	โรคที่ได้รับ รายงานด้วย บัตร 506	ร้อยละ	จำนวนโรคที่ ต้องแจ้งทาง โทรศัพท์	จำนวนรับ แจ้งภายใน 1 วัน	ร้อยละ	
อายุรกรรมชาย 1	35	32	91.42	1	1	100	
อายุรกรรมชาย 2	25	22	88	2	2	100	
อายุรกรรมหญิง 1	18	16	88.88	1	1	100	
อายุรกรรมหญิง 2	20	18	90	-	-	-	
กุมารเวชกรรม	22	22	100	3	3	100	
พิเศษ 72 ปี ชั้น 2	-	-	-	-	-	-	
พิเศษ 50 ปี	4	4	100	-	-	-	
ICU ทัวไป	-	-	-	-	-	-	
OPD เด็ก	-	-	-	-	-	-	
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง	-	-	-	-	-	-	
รพ.เพชรรัตน์	-	-	-	4	4	100	
Premium ชั้น 4	-	-	-	-	-	-	
รวม	124	114	91.93	11	11	100	

ด้านเกณฑ์มาตรฐานงานระบาดวิทยา

ความครบถ้วนของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่สำคัญพบว่าทุกหน่วยงานส่งรายงานผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตารางที่ 5 สรุปการส่งรายงาน 506 ของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	หอผู้ป่วย	จำนวนโรคที่ ต้องรายงาน บัตร 506	จำนวน บัตร 506 ที่ส่ง	ลำดับที่ไม่ได้ส่งบัตร 506	หมายเหตุ
1	อายุรกรรมชาย 1	35	32	1,3,27	
2	อายุรกรรมชาย 2	25	22	7,23,25	
3	อายุรกรรมหญิง 1	18	16	15,18	
4	อายุรกรรมหญิง 2	20	18	17,18	
5	กุมารเวชกรรม	22	22	รายงานครบถ้วน	
6	พิเศษ 50 ปี	4	4	รายงานครบถ้วน	

หมายเหตุ ขอความขอบคุณและชมเชยหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการส่งรายงาน
ได้ครบถ้วนและขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยใน ดำเนินการการส่งรายงาน 506

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒-๘ ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

อาการ

อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็นโรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญ ๔ ประการคือ

๑. ไข้สูงลอย : ไข้ ๓๙-๔๐ มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ ๔-๕ วัน

๒. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว

๓. ตับโต

๔. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

การปฏิบัติเมื่อมีคนในบ้าน/ข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก

เนื่องจากไข้เลือดออกกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า มีคนเป็นไข้เลือดออกด้วย และแจ้งสาธารณสุขให้มาฉีดยาหมอกควันเพื่อฆ่ายุง รวมถึงดูแลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกันการถูกยุงกัด สักร่างภายในบ้าน รอบบ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงหรือไม่ หากมีให้บริหารจัดการและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์นั้น เพื่อป้องกันการเป็น ไข้เลือดออก นอกจากนี้ต้องคอยระวังเฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็น ไข้เลือดออกได้

การป้องกันโรค

ทุกวันนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษา ไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง คือ

๑. ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ซึ่งยุงลายนี้จะกัดในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ

๒. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ดังนั้นส่วนใหญ่สถานที่เพาะพันธุ์ยุงลายจะเป็นภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วย รองขาตุ๋นแกง แก้วกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำโดย

- ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิด

- ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะขังน้ำไว้ใช้เพื่อทำลายไข่ยุง (ซึ่งสามารถรับได้ที่สถานีนอนามัย)

- ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้

- พันละอองยา ทำลายยุงลาย

การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental management

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์ แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่